




STROC
Equine Nutrition

stroc.es

STROC-BREEDING / Piensos de CRÍA Y CRECIMIENTO

Stroc GROW UP

Potros de 1 a 4 años

Stroc GROW UP

Destinado a potros desde los 12-18 meses de edad hasta la finalización del crecimiento a los 3 o 4 años.

Aporta las cantidades necesarias de nutrientes para satisfacer los requerimientos nutricionales en esta compleja etapa de crecimiento en la que además de incrementar el tamaño y peso, desarrollan sus órganos y sistemas.

Composición Analítica por kg.

Proteína Bruta	15,00%
Grasa Bruta	5,50%
Fibra Bruta	10,50%
Ceniza Bruta	8,70%
Almidón	25,50%
Azúcares	4,90%
Sodio	0,21%
Metionina	3,20 gr
Lisina	8,50 gr
Calcio	1,40%
Fósforo	0,70%
Magnesio	0,43%

Vitaminas Liposolubles por kg.

Vitamina A	12.000 UI
Vitamina D3	2.400 UI
Vitamina E	200 mg
Vitamina K3	2,00 mg

Vitaminas Hidrosolubles por kg.

Vitamina B1	8,00 mg
Vitamina B2	9,60 mg
Vitamina B6	8,00 mg
Vitamina B12	0,12 mg
Ácido Fólico	8,00 mg
Niacinamida	20,00 mg
Ácido Pantoténico	12,00 mg
Biotina	

Digestivos

Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-1077	6x10(9)
--------------------------------------	---------

Minerales traza mg/kg.

Cobre (Sulfato)	14,00 mg
Cobre (Orgánico)	14,00 mg
Zinc (Óxido)	60,00 mg
Zinc (Orgánico)	60,00 mg
Yodo (Potasico)	1,10 mg
Hierro (Sulfato)	4,00 mg
Manganeso (Óxido)	48,00 mg
Manganeso (Orgánico)	50,00 mg
Selenio (Sódico)	0,20 mg
Selenio (Orgánico)	0,20 mg

AENOR	AENOR	AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN AMBIENTAL	SEGURIDAD ALIMENTARIA
ISO 9001	ISO 14001	ISO 22000

Potenciador digestivo - probiótico

Enriquecido con **Levaduras Vivas Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-1077**, estabilizador y promotor del desarrollo de la flora intestinal, mejorando la digestibilidad de los alimentos y por lo tanto aumentando la absorción de sus nutrientes. También favorece un pH adecuado, previniendo cólicos y úlceras gástricas.

Instrucciones de uso

Este es un pienso complementario de pastos y/o forrajes, y se puede suministrar desde 0'5 Kg hasta 1'5 Kg por cada 100 Kg de peso vivo.

Repartir la ración en, al menos, tres tomas, suministrando siempre suficiente forraje de buena calidad (mínimo de 1'5% a 2% del peso vivo del animal).

Almacenamiento

Conserve los alimentos en lugares adecuados: frescos, limpios, ventilados y libres de humedad, insectos y roedores, con el fin de suministrarlos en óptimas condiciones de seguridad e higiene a nuestro caballo.



Sacos de 25 Kg.



Stroc Pellets 6 mm Ø.