




STROC
Equine Nutrition

stroc.es

STROC-SPECIALITIES / Piensos ESPECIALES

MAXFIBRE

Pienso veterinario

Stroc MAXFIBRE

Pienso veterinario destinado a caballos:

Con laminitis o propensos a ella.

Que necesitan una ración baja en calorías (almidón, azúcares)

Que tienen intolerancia a cualquier cereal.

De edad avanzada, sin actividad, y con problemas dentales.

Contiene elevados niveles de fibras digestibles, así como biotina para una recuperación satisfactoria de los cascos.

Con un alto contenido en Biotina: 15 mg por kg

No contiene cereales, de ahí su bajo nivel de almidones.

Composición Analítica por kg.

Proteína Bruta	8,80%
Grasa Bruta	5,50%
Fibra Bruta	24,90%
Ceniza Bruta	8,60%
Almidón	8,50%
Azúcares	3,00%
Sodio	0,41%
Metionina	2,00 gr
Lisina	7,00 gr
Calcio	1,00%
Fósforo	0,50%
Magnesio	0,30%

Vitaminas Liposolubles por kg.

Vitamina A	15.000 UI
Vitamina D3	3.000 UI
Vitamina E	250 mg
Vitamina K3	2,50 mg

Vitaminas Hidrosolubles por kg.

Vitamina B1	10,00 mg
Vitamina B2	12,00 mg
Vitamina B6	10,00 mg
Vitamina B12	0,15 mg
Ácido Fólico	10,00 mg
Niacinamida	25,00 mg
Ácido Pantoténico	15,00 mg
Biotina	15,00 mg

Digestivos

Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-1077	6x10(9)
--------------------------------------	---------

Minerales traza mg/kg.

Cobre (Sulfato)	17,00 mg
Cobre (Orgánico)	17,00 mg
Zinc (Óxido)	75,00 mg
Zinc (Orgánico)	75,00 mg
Yodo (Potasio)	1,37 mg
Hierro (Sulfato)	5,00 mg
Manganeso (Óxido)	60,00 mg
Manganeso (Orgánico)	62,00 mg
Selenio (Sódico)	0,25 mg
Selenio (Orgánico)	0,25 mg

AENOR	AENOR	AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN AMBIENTAL	SEGURIDAD ALIMENTARIA
ISO 9001	ISO 14001	ISO 22000

Potenciador digestivo - probiótico

Enriquecido con **Levaduras Vivas Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-1077**, estabilizador y promotor del desarrollo de la flora intestinal, mejorando la digestibilidad de los alimentos y por lo tanto aumentando la absorción de sus nutrientes. También favorece un pH adecuado, previniendo cólicos y úlceras gástricas.

Instrucciones de uso

Este es un pienso complementario de pastos y/o forrajes, y se puede suministrar desde 0'5Kg hasta 1'5Kg por cada 100Kg de peso vivo.

Repartir la ración en, al menos, tres tomas, suministrando siempre suficiente forraje de buena calidad (mínimo de 1'5% a 2% del peso vivo del animal).

Almacenamiento

Conserve los alimentos en lugares adecuados: frescos, limpios, ventilados y libres de humedad, insectos y roedores, con el fin de suministrarlos en óptimas condiciones de seguridad e higiene a nuestro caballo.



Sacos de 20 Kg.



Stroc Pellets 8 mm Ø.