




STROC

Equine Nutrition

stroc.es

STROC-SPECIALITIES / Pienso ESPECIAL

SOAK FIBRE

Pienso veterinario hidratante

Stroc SOAK FIBRE

Es una versión de Stroc MAXFIBRE especialmente indicada para épocas de calor o para caballos que precisan una hidratación extra.

Recomendado además para caballos y ponis en cualquiera de las siguientes situaciones: en descanso o actividad ligera, propensos a cólicos o laminitis, que engordan con facilidad, con dificultad para masticar, o para caballos con alergias alimentarias, especialmente a cereales, o que necesitan un sustitutivo de forraje parcialmente.

En caballos de avanzada edad con problemas dentales, pues puede sustituir parcialmente el aporte de forrajes.

Es un complemento fibroso de alta calidad, muy recomendado en periodos de altas temperaturas para ayudar a la hidratación del caballo.

★ Muy recomendable en periodos de altas temperaturas por ayudar a la hidratación del caballo ★

Composición Analítica por kg.	
Proteína Bruta	8,50%
Grasa Bruta	4,80%
Fibra Bruta	22,00%
Ceniza Bruta	7,50%
Almidón	9,80%
Azúcares	4,80%
Sodio	0,44%
Metionina	1,50 gr
Lisina	5,00 gr
Calcio	0,95%
Fósforo	0,47%
Magnesio	0,26%

AENOR	AENOR	AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD	GESTIÓN AMBIENTAL	SEGURIDAD ALIMENTARIA
ISO 9001	ISO 14001	ISO 22000

Vitaminas Liposolubles por kg.	
Vitamina A	10.000UI
Vitamina D3	2.000UI
Vitamina E	165 mg
Vitamina K3	1,60 mg
Vitaminas Hidrosolubles por kg.	
Vitamina B1	6,60 mg
Vitamina B2	7,90 mg
Vitamina B6	6,60 mg
Vitamina B12	0,10 mg
Ácido Fólico	6,60 mg
Niacinamida	16,00 mg
Ácido Pantoténico	10,00 mg
Biotina	0,50 mg
Digestivos	
Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-1077	6x10(9)

Minerales traza mg/kg.	
Cobre (Sulfato)	12,00 mg
Cobre (Orgánico)	12,00 mg
Zinc (Óxido)	48,00 mg
Zinc (Orgánico)	49,00 mg
Yodo (Potasio)	0,91 mg
Hierro (Sulfato)	3,00 mg
Manganeso (Óxido)	39,00 mg
Manganeso (Orgánico)	41,00 mg
Selenio (Sódico)	0,16 mg
Selenio (Orgánico)	0,16 mg

Potenciador digestivo - probiótico

Enriquecido con **Levaduras Vivas Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-1077**, estabilizador y promotor del desarrollo de la flora intestinal, mejorando la digestibilidad de los alimentos y por lo tanto aumentando la absorción de sus nutrientes. También favorece un pH adecuado, previniendo cólicos y úlceras gástricas.

Instrucciones de uso

Stroc SOAK FIBRE NUNCA DEBE SUMINISTRARSE EN SECO, ni habiéndose resecado tras su hidratación.

Este producto, que contiene pulpa de remolacha, debe ponerse en un recipiente, añadimos el doble de agua que de pienso, esperamos entre tres y cinco minutos a que se hidrate, removemos y damos a continuación a nuestro caballo esta papilla refrescante o este reconfortante puré (según la temperatura del agua que añadamos -fresca o templada- en función de la estación en la que nos hallemos).

Este es un pienso complementario de pastos y/o forrajes, y se puede suministrar desde 0'5Kg hasta 1'5Kg por cada 100Kg de peso vivo.

Repartir la ración en, al menos, tres tomas, suministrando siempre suficiente forraje de buena calidad (mínimo de 1'5% a 2% del peso vivo del animal).

Almacenamiento

Conserve los alimentos en lugares adecuados:

frescos, limpios, ventilados y libres de humedad, insectos y roedores, con el fin de suministrarlos en óptimas condiciones de seguridad e higiene a nuestro caballo.



Sacos de 25 Kg.



Stroc Pellets 3,5 mm Ø.